

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes




El embarazo en adolescentes es un problema que ha aumentado en nuestro país en las últimas décadas. De ahí la urgencia de contar con una Estrategia Nacional para combatirlo. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre sus estados miembros, México ocupa el primer lugar en el número de embarazos de niñas de 12 a 19 años de edad.

REALIDAD



Las causas de este fenómeno son multifactoriales. “Sólo una de cada siete de las adolescentes de 10 a 14 años que tuvo un parto, vivía en un municipio con muy baja marginación, lo que muestra que este fenómeno no está condicionado únicamente por factores de pobreza, sino que influyen otros como el contexto cultural, económico y social como son la violencia familiar, sexual y de género”.

CAUSAS



Los índices de mortalidad materna son más elevados en mujeres adolescentes. Datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) que indican que la razón de mortalidad materna promedio registrada entre los años 2006 y 2012 para el grupo de niñas de 10 a 14 años, es de 58.9 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. El riesgo de muerte para madres de 15 años, o más jóvenes, es 60% mayor que el de madres de 20 años.

CONSECUENCIAS

IMPLANTES	DIU	PÍLDORA	CONDÓN MASCULINO
<p>Cómo usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deben ser colocados por un proveedor de atención médica. Duran hasta 3 años. 	<p>Cómo usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deben ser colocados por un proveedor de atención médica. Los DIU de cobre duran hasta 10 años. Los DIU de progesterona duran de 3 a 5 años. 	<p>Cómo usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deben tomarse cada día a la misma hora. 	<p>Cómo usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deben usarse correctamente cada vez que se tengan relaciones sexuales.
<p>Probabilidades de embarazo: Menos de 1 en cada 100 mujeres*.</p>	<p>Probabilidades de embarazo: Menos de 1 en cada 100 mujeres*.</p>	<p>Probabilidades de embarazo: 9 en cada 100 mujeres.*</p>	<p>Probabilidades de embarazo: 18 en cada 100 mujeres.*</p>
<p>MÁS EFICAZ</p>		<p>MENOS EFICAZ</p>	
<p><i>Los condones se deben usar siempre junto con el método anticonceptivo de preferencia para proteger contra las enfermedades de transmisión sexual.</i></p>			

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS